

Station de baguage d'oiseaux " Schlammwiss"

BILAN 2017

Réserve Naturelle - Fondation Hëllef fir d'Natur
« SCHLAMMWISS »



Figures sur la page de couverture: Schlammwiss au coucher; bruant nain bagué au 09.04; pouillot à grands sourcils bagué au 01.10 et visite de classe dans la réserve

Avant-propos	3
L'Equipe de la « Bird Ringing Station Schlammwiss 2017 »	4
Etudes et projets	5
Collecte d'autres données	6
Monitoring des oiseaux nicheurs	7
Bilan des captures et baguages (jusqu'au 19.11.17)	14
Captures internationales	18
Captures ou observations « particulières » en 2017 dans la réserve naturelle Schlammwiss-Uebersyren	21
Visites, activités et autres	23
Nos bagueurs à l'étranger	23
Calendrier 2018	26
Merci au service technique	28
Sponsoring	28

Avant-propos

Les activités de la Station de baguage d'oiseaux "Schlammwiss" à Uebersyren, située dans une réserve naturelle de natur&ëmwelt - Fondation Hëllef fir d'Natur avec plus de 25 ha de biotopes rares et dans une zone de protection spéciale - natura 2000, étaient très diversifiées et réparties sur toute l'année.

Les domaines d'activités peuvent être répartis comme suit :

- Capture et baguage d'oiseaux dans un but scientifique
- Visites pédagogiques et de sensibilisation du « grand public » jeunes et adultes
- Collecte de données dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire
- Collecte de données concernant des projets d'étudiants (doctorants et autres)
- Monitoring et inventaire des espèces nicheuses et recherche d'une gestion optimale de la réserve naturelle y compris la réserve de Mensdorf
- Initiation de nouveaux bagueurs
- Visites d'étudiants de l'Université de Trèves et autres
- Visites de bagueurs étrangers
- Visites de classes scolaires (ens. primaire et secondaire)
- Application de l'agrément « *Acrocephalus paludicola* » dans le cadre de la convention de BONN-AEWA
- Fourniture de données au MDDI (Ministère du Développement Durable et des Infrastructures) pour divers reportings

Merci à Max Steinmetz pour la rédaction et la mise en page de ce rapport, à Cédric Brodin & Pascale Karger pour la gestion des données et des statistiques.

Les plus vifs remerciements à toute l'équipe pour son engagement et sa convivialité.

Jim Schmitz

Responsable de la Station de baguage "Schlammwiss" Uebersyren

L'Equipe de la « Bird Ringing Station Schlammwiss 2017 »

En 2017 l'équipe a vu arriver : Noémie Engel, Kevin Kohn, Alexandra Molitor, Kelly Kieffer, Anna Wanderscheid, Yana Caye, Jeff Caye et Sandra Vieira

Sans oublier les « anciens » :

Mike Moro, Céline Munisso, Alain Maury, Raoul Mettenhoven, Dorothée Jacquel, Marielle Peiffer, Barry Magee, Rick Reicher, Nicole Thien, Dave Lutgen, Cédric Brodin, Joseph Dunlop, Guy Zenner, Hélène Dirkes, Max Steinmetz, Yves Determe, Anne Determe, Sandra Falsetti, Linda Dell'Angela, Philip Birget, Xavier Schmit, Sören Greule, Michael Boetzel, Fernand Kinnen, Jeanne-Marie Kinnen, Jim Schmitz, Thierry Louppe, Nuria Quiroga, Niall Foley, Charel Klein, Michel Kraus, Claude Kraus, Eric Kraus, Tiago De Sousa, Yana Werdel, Martine Reisen, Michèle Reisen, Lisa Pain, Claude Truchi, Tattiana Villalobos, Hannah Kruft, Mike Müller, Pascale Karger

“Anciens” vivants à l'étranger :

Olatz San Roman (Panama), Maria Liivrand (Finlande), Elisabeth Imhof (RFA)

Un merci spécial à : Guy Mirgain, Patric Lorgé pour leur “assistance informatique”.

Documentation photographique : Max Steinmetz, Dave Lutgen et Jim Schmitz.

Gestion des données et rapport : Cédric Brodin et Pascale Karger.

Etudes et projets

En 2017 les études suivantes étaient en cours d'exécution

- Etude des territoires de la rousserolle verderolle par observation d'oiseaux bagués avec des bagues de couleur
- Etude de la migration de la rousserolle effarvate à l'aide de géolocalisateurs - Actuellement 5 géolocalisateurs repris sur des oiseaux nicheurs, les données sont en analyse



Recapture d'un géolocalisateur

- Monitoring des oiseaux nicheurs de la réserve naturelle Schlammwiss et de la réserve de Mensdorf en 2017 - ledit monitoring, testé en 2016, a été effectué de mai à septembre, les résultats complets seront disponibles début 2018. Un monitoring moins intensif a été effectué dans la zone Natura 2000 de la vallée de la Syre. (voir chapitre 'Monitoring des oiseaux nicheurs' avec les différentes cartes)



Monitoring intensif avec une équipe bien engagée

- Projet clip publicitaire sur la réserve naturelle Schlammwiss - les enregistrements ont été faits en juillet et septembre avec notre équipement semi professionnel (caméra DSLR et drone) et la réalisation digitale en août. Vous trouverez le clip sur notre site sur facebook 'Birdringingstation Schlammwiss' ou sur youtube sous 'Schlammwiss'



Visite surprise d'une couleuvre à collier

Collecte d'autres données

Outre l'activité de baguage d'oiseaux, la station de Uebersyren participe à plusieurs programmes de collecte de données pour un bon nombre d'organismes différents. En voici quelques exemples :

- Grippe aviaire : collecte d'échantillons reprise cette année, il est important de noter que depuis quelques années la station collecte des échantillons pour la surveillance de la grippe aviaire et d'autres maladies relatives à l'avifaune pour les besoins de l'Inspection vétérinaire ;
- Borréliose : parallèlement à l'analyse de la grippe aviaire, la collecte de tiques est aussi réalisée lors du baguage pour les besoins du Ministère de la santé ;
- Programme PUIPO : étude sur les mouches-plates, ectoparasites hématophages notamment des oiseaux. L'étude se focalise notamment sur la prévalence de ces parasites chez les oiseaux ;
- STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) : chaque année la station de baguage participe à ce programme qui consiste à évaluer l'évolution des oiseaux par une méthode d'échantillonnage ;
- Suivi des oiseaux d'eau : suivi annuel hivernal pour la COL ;
- Reporting Commission européenne Natura 2000 : grâce au nombre important de données collectées et la station étant dans une Zone de Protection Spéciale (surface Natura 2000 avec une avifaune particulière) le Ministère de l'Environnement demande des données relatives au baguage pour son reporting Natura 2000.

Monitoring des oiseaux nicheurs


Méthode

Cette année nous avons continué avec le monitoring systématique de nos espèces nicheuses. Le but est d'avoir une estimation approximative de la population locale de certaines espèces importantes. Pour évaluer les données d'observations sauvegardées sur la plateforme ornitho, le livre sur les méthodes standardisées pour la collecte d'oiseaux nicheurs de l'Allemagne de Südbeck et al. (2005) a été consulté. À partir des observations (dont une majorité dans catégorie A2), nous avons regroupé ceux-ci dans des territoires et calculé le nombre de couples nicheurs dans la vallée de la Syre de Mensdorf à Uebersyren. Tout en respectant les critères d'évaluation respectives aux espèces. Toutes les observations ont été faites entre le 1 avril et le 15 septembre. Il est à ajouter que cette approche produit des estimations de densités minimales avec un haut risque de sous-estimation.

Le monitoring a été effectué sur une superficie totale de 122,6 hectares, regroupant différents habitats majoritairement roselières, pâturages, prés de fauche et haies le long de la vallée de la Syre. Les indications sur les densités de couples nicheurs ont été faites sur base de cette superficie, comprenant aussi des habitats moins appropriés pour nicher pour l'espèce respective.

Le RAPPORT COMPLET des espèces nicheuses dans la réserve Schlammwiss de la saison 2017 peut être consulté sur notre site :

<https://www.birdringingstation-schlammwiss.com/blog/>



La surface totale du monitoring dans la vallée de la Syre entre Mensdorf et Uebersyren et dans la réserve naturelle Schlammwiss



Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus*

Le monitoring des rousserolles effarvates s'est fait par l'écoute des adultes chantant ou paradant dans les milieux humides / roselières pendant le 29 avril et le 18 juillet. L'observation directe a été plutôt difficile. Südbeck et al. (2005) recommande d'évaluer les observations selon les critères suivants:

- Couvée probable: détections de catégorie B dont en particulier : comportement territorial - 2 détections d'A2 (chant/parade) avec un écart de ≥ 7 jours dont une pendant Juin OU 1 détection d'A2 pendant dans la 2ème moitié de Juin
- Couvée certaine: 1 détection de catégorie C

Les milieux humides dans la vallée de la Syre entre Mensdorf et Uebersyren ont hébergé, selon les critères cités, une totalité de 44 COUPLES NICHEURS (PROBABLES) DE ROUSSEROLLES EFFARVATES AVEC UNE DENSITÉ DE 0,36 COUPLES/HA. La distribution des territoires est représentée sur les cartes en dessous, 20 couples ont été enregistrés entre Mensdorf et le pont de l'autoroute A1, 16 couples entre le pont et le terrain de football à Uebersyren et 8 couples dans la partie sud de Uebersyren. La distribution renseigne sur l'habitat préféré de la rousserolle effarvate - au milieu des épaisses ceintures de roseaux.



Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*

Le monitoring des rousserolles verderolles s'est fait similairement à son compatriote par l'écoute des adultes chantant ou paradant pendant le 29. avril et le 18. juillet. Südbeck et al. (2005) recommande d'évaluer les observations selon les critères suivants:

- Couvée probable: détections de catégorie B dont en particulier: comportement territorial - 2 détections d'A2 (chant/parade) avec un écart de ≥ 7 jours dont une pendant Juin
- Couvée certaine: 1 détection de catégorie C

Les milieux humides dans la vallée de la Syre entre Mensdorf et Uebersyren ont hébergé, selon les critères cités, une totalité de 33 COUPLES NICHEURS (PROBABLES) DE ROUSSEROLLES VERDEROLLES AVEC UNE DENSITÉ DE 0,27 COUPLES/HA. La distribution des territoires est représentée sur les cartes en dessous; 5 couples ont été enregistrés entre Mensdorf et le pont de l'autoroute A1, 27 couples entre le pont et le terrain de football à Uebersyren et 1 couple dans la partie sud de Uebersyren. Contrairement à la rousserolle effarvate, la rousserolle verderolle a aussi été enregistrée dans les habitats autour des roselières regroupant une diversité de stades et de couvertures végétales dont arbustes et lisières de forêt. En comparant ces résultats à l'année dernière avec 21 couples, une hausse de population est enregistrée, probablement suite aux conditions favorables pendant la période de nidification.





Locustelle tachetée *Locustella naevia*


Le monitoring des locustelles tachetées s'est fait aussi par l'écoute des adultes chantant ou paradant pendant le 29 avril et le 18 juillet. Südbeck et al. (2005) recommande d'évaluer les observations selon les critères suivants:

- Couvée probable: détections de catégorie B dont en particulier: comportement territorial - 2 détections d'A2 (chant/parade) avec un écart de ≥ 7 jours dont une pendant fin Mai et fin Juin
- Couvée certaine: 1 détection de catégorie C

Les milieux humides dans la vallée de la Syre entre Mensdorf et Uebersyren ont hébergé, selon les critères cités, une totalité de 10 COUPLES NICHEURS (PROBABLES) DE LOCUSTELLES TACHETÉES AVEC UNE DENSITÉ DE 0,08 COUPLES/HA. La distribution des territoires est représentée sur les cartes en dessous; 3 couples ont été enregistrés entre Mensdorf et le pont de l'autoroute A1 et 7 couples entre le pont et le terrain de football à Uebersyren. En comparant ces résultats à l'année dernière avec 4 couples, aussi pour la locustelle une hausse de population est enregistrée, probablement suite aux conditions favorables pendant la période de nidification.



La distribution d'observations de rousserolles et de locustelles faites dans la roselière près de Mensdorf et Uebersyren



La distribution d'observations de rousserolles et de locustelles faites dans la roselière près de Uebersyren



Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

Le monitoring des bruants des roseaux s'est fait majoritairement par l'écoute des adultes chantant ou paradant à partir des roseaux ou des perchoirs élevés. On a aussi pu faire des observations de couple ensemble, des querelles de dominance et des oisillons, tout pendant le 29 avril et le 26 juin. Südbeck et al. (2005) recommande d'évaluer les observations selon les critères suivants:

- Couvée probable: détections de catégorie B dont en particulier: comportement territorial - 2 détections d'A2 (chant/parade) avec un écart de ≥ 7 jours dont une pendant début Mai et début Juin
- Couvée certaine: 1 détection de catégorie C

Les milieux humides dans la vallée de la Syre entre Mensdorf et Uebersyren ont hébergé, selon les critères cités, une totalité de 31 COUPLES NICHEURS (30 PROBABLES ET 1 CERTAINE) DE BRUANTS DES ROSEAUX AVEC UNE DENSITÉ DE 0,25 COUPLES/HA. La distribution des territoires est représentée sur les cartes en dessous; 15 couples ont été enregistrées entre Mensdorf et le pont de l'autoroute A1, 13 couples entre le pont et le terrain de football à Uebersyren et 3 couples dans la partie sud de Uebersyren. La diversité d'habitats trouvés le long de la Syre correspond aux besoins territoriales de cette espèce et favorise la population locale.



Tarier pâtre *Saxicola rubicola*

Le monitoring des tariers pâtres s'est fait par l'écoute des adultes chantant ou paradant à partir des perchoirs élevés. On a aussi pu faire des observations de couples, entre le 5 mai et le 13 juillet. Südbeck et al. (2005) recommande d'évaluer les observations selon les critères suivants:

- Couvée probable: détections de catégorie B dont en particulier: comportement territorial - 2 détections d'A2 (chant/parade) avec un écart de ≥ 7 jours dont une pendant début Avril et mi Mai
- Couvée certaine: 1 détection de catégorie C


Les milieux humides dans la vallée de la Syre entre Mensdorf et Uebersyren ont hébergé, selon les critères cités, une totalité de 8 COUPLES NICHEURS (PROBABLES) DE TARIERS PÂTRES AVEC UNE DENSITÉ DE 0,07 COUPLES/HA. La distribution des territoires est représentée sur les cartes en dessous; 4 couples ont été enregistrées entre Mensdorf et le pont de l'autoroute A1 et 4 couples entre le pont et le terrain de football à Uebersyren. La distribution s'explique selon l'habitat préféré du tarier pâtre - des prairies humides et cultivées.



La distribution d'observations de bruants de roseaux et de tariers pâtres faites entre Niederanven et Mensdorf



La distribution d'observations de bruants de roseaux et de tariers pâtres faites à Uebersyren



La distribution d'observations de bruants de roseaux et de tariers pâtres faites à Uebersyren

Bilan des captures et baguages

Voici le résumé des captures et baguages de 2016 et 2017. Bien qu'il y eût une hausse de captures et d'oiseaux bagués en total de 10'344 individus en 2016 à 15'919 oiseaux en 2017, les captures contrôlées ont légèrement diminué. On a pu baguer nettement plus d'hirondelles rustiques (+2702 ind), de rousserolles effarvées (+1368 ind) et de mésanges bleues (+ 778 ind) en 2017. Ces développements sont d'une part dus à une augmentation d'effort, les heures prestées par le volontariat d'élevant de plus de 6000 h pour 2017, et d'autre part à des conditions favorables pendant la saison nicheuse 2017 pour une majorité d'espèces.

Espèce	2016			2017			Tendance (E)
	*E	*W	*K	E	W	K	16 - 17
Accipiter gentilis				1			+1
Accipiter nisus	2			3	1		+1
Acrocephalus arundinaceus	3			11	11		+8
Acrocephalus paludicola				4	1		+4
Acrocephalus palustris	562	204	26	730	293	35	+168
Acrocephalus schoenobaenus	300	57	6	423	84	8	+123
Acrocephalus scirpaceus	3087	501	56	4.455	675	69	+1368
Actitis hypoleucos	12	4		6	1		-6
Aegithalos caudatus	17	16	18	22	7	3	+5
Alauda arvensis	7			20			+13
Alcedo atthis	32	38		24	35		-8
Anas platyrhynchos	3			3			0
Anthus pratensis				1			+1
Anthus spinoletta	40	14	23	60	4	16	+20
Anthus trivialis	11			21			+10
Apus apus	7						-7
Ardea cinerea	1						-1
Athene noctua	2			4			+2

Bubo bubo				2			+2
Buteo buteo				3			+3
Calidris alpina	1						-1
Calidris temminckii	1						-1
Carduelis cannabina	5			9	1		+4
Carduelis carduelis	31	1	3	85	1	5	+54
Carduelis chloris	8		1	57	13	6	+46
Carduelis spinus	3						-3
Certhia brachydactyla	8		2	18	9	1	+10
Certhia familiaris				3			+3
Charadrius dubius				1			+1
Coccothraustes coccothraustes	28	2	1				-28
Columba palumbus				1			+1
Corvus corone corone		1		1			+1
Coturnix coturnix	2			1			-1
Delichon urbicum	35	2	4	181	4	4	+146
Dendrocopos major	2	9	4	13	25	3	+10
Dendrocopus medius	1	2		2	9	1	+1
Dryobates minor			1	2	1		+2
Emberiza citrinella	67	39	22	30	6	9	-37
Emberiza pusilla				1	1		+1
Emberiza schoeniclus	470	209	67	296	106	40	-174
Erithacus rubecula	768	178	18	706	124	17	-62
Falco tinnunculus	2	1		9			+7
Ficedula hypoleuca	25			13			-12
Fringilla coelebs	34	11	17	49	15	16	+15
Fulica atra				2			+2
Gallinago gallinago	31	2	8	3			-28
Gallinula chloropus	9	5		37	3	9	+28

Garrulus glandarius				2		1	+2
Hippolais icterina				2			+2
Hippolais polyglotta	4			6			+2
Hirundo rustica	424	5	9	3.162	87	42	+2738
Ixobrychus minutus	2			1	1		-1
Jynx torquilla	30	2		36	4		+6
Lanius collurio	3			13			+10
Locustella luscinioides	16	8		23	7	2	+7
Locustella naevia	108	32		195	34	2	+87
Luscinia megarhynchos	1	4		37	4		+36
Luscinia svecica	7	19		60	11	1	+53
Luscinia svecica cyaneola	70	1		3			-67
Motacilla alba	47	6	4	15	1	6	-32
Motacilla cinerea	7			2		1	-5
Motacilla flava				27			+27
Muscicapa striata	1			1			0
Oenanthe oenanthe				1			+1
Panurus biarmicus		3	2	1	1	1	+1
Parus ater				3	1		+3
Parus caeruleus	307	344	105	1.152	1128	105	+845
Parus cristatus				1			+1
Parus major	159	197	110	494	522	52	+335
Parus montanus	5	11	2	10	18	1	+5
Parus palustris	6	20	3	19	42	3	+13
Passer domesticus	56	21	11	99	18	39	+43
Passer montanus	53	12	14	25	2	2	-28
Phoenicurus ochruros	7		1	8			+1
Phoenicurus phoenicurus	37		1	28			-9
Phylloscopus collybita	643	175	61	722	280	46	+79

Phylloscopus collybita abietinus	5		1	3			-2
Phylloscopus inornatus				1			+1
Phylloscopus trochilus	72	3	1	90	4		+18
Pica pica	5			1			-4
Picus viridis				1			+1
Porzana porzana	1	1		8			+7
Prunella modularis	252	52	15	266	84	25	+14
Pyrrhula pyrrhula europaea	6	2	1	13	1		+7
Rallus aquaticus	19	10	10	16			-3
Regulus ignicapilla	3	1		1			-2
Regulus regulus	10			4	1		-6
Remiz pendulinus	3		1	3			0
Riparia riparia	3			8			+5
Saxicola rubetra	38			39	1		+1
Saxicola torquata	26	3		14	2		-12
Sitta europea	3	19	6	8	11	4	+5
Sturnus vulgaris	94	1	1	101	6		+7
Sylvia atricapilla	1468	136	51	1.218	222	39	-250
Sylvia borin	218	29	7	188	19	7	-30
Sylvia communis	207	46	20	424	92	15	+217
Sylvia curruca	25	3	3	20	4		-5
Tachybaptus ruficollis	2			2			0
Tringa ochropus	7	1		1			-6
Troglodytes troglodytes	93	62	18	72	34	12	-21
Turdus iliacus	3			9			+6
Turdus merula	99	78	38	98	106	49	-1
Turdus philomelos	37	1		38	4	1	+1
Turdus pilaris	35	1		12	2	2	-23

Turdus viscivorus				1			+1
Tyto alba				7			+7
Total	10344	2605	773	16130	4185	700	+5786

*E = oiseaux qui sont bagués pour la première fois (Erstfänge)

*W = oiseaux recapturés, étant bagués récemment (Wiederfänge)

*K = oiseaux recapturés, étant bagués pendant la saison antérieure OU bagué d'ailleurs (Kontrollfänge)



Captures internationales

Espèce		ID	Date du contrôle	Origine	Centrale
Bruant des roseaux	Emberiza schoeniclus	14756011	01/09/2017	Belgique	DDH
Bruant des roseaux	Emberiza schoeniclus	1EZ26749	27/10/2017	Suède	NLA
Bruant des roseaux	Emberiza schoeniclus	14392324	14/10/2017	Belgique	BLB
Fauvette à tête noire	Sylvia atricapilla	14756536	02/09/2017	Belgique	SVS
Fauvette à tête noire	Sylvia atricapilla	15004434	23/09/2017	Belgique	BLB
Fauvette des jardins	Sylvia borin	V0791410	14/05/2017	Pays-bas	BLB
Fauvette grisette	Sylvia communis	14799536	13/08/2017	Belgique	DDH
Gorge-bleue	Luscinia svecica	8070518	01/09/2017	France	DDH
Gorge-bleue	Luscinia svecica	8070518	10/09/2017	France	BLB
Gorge-bleue	Luscinia svecica	8070518	05/09/2017	France	FRP
Hirondelle rustique	Hirundo rustica	7860849	27/08/2017	France	FRP
Hirondelle rustique	Hirundo rustica	B04J9334	31/08/2017	Allemagne	DDH
Hirondelle rustique	Hirundo rustica	14646068	16/08/2017	Belgique	NOS
Hirondelle rustique	Hirundo rustica	B04R3189	17/08/2017	Allemagne	FRP
Hirondelle rustique	Hirundo rustica	90409759	30/08/2017	Allemagne	BLB
Hirondelle rustique	Hirundo rustica	14468210	31/08/2017	Belgique	NLA
Locustelle lusciniöide	Locustella luscinioides	BE071024	30/08/2017	Pays-bas	DDH
Locustelle lusciniöide	Locustella luscinioides	BE071647	19/08/2017	Pays-bas	BLB

Mésange bleue	Parus caeruleus	B04Y1476	04/11/2017	Allemagne	BLB
Mésange bleue	Parus caeruleus	14467912	27/10/2017	Belgique	ESA
Panure à moustaches	Panurus biarmicus	BG074584	15/10/2017	Pays-bas	BLB
Phragmite des joncs	Acrocephalus schoenobaenus	BH020949	25/08/2017	Pays-bas	BLB
Phragmite des joncs	Acrocephalus schoenobaenus	13965841	22/04/2017	Belgique	BLB
Phragmite des joncs	Acrocephalus schoenobaenus	8018651	27/07/2017	France	BLB
Phragmite des joncs	Acrocephalus schoenobaenus	11788035	18/08/2017	Belgique	BLB
Phragmite des joncs	Acrocephalus schoenobaenus	15011846	25/08/2017	Belgique	BLB
Phragmite des joncs	Acrocephalus schoenobaenus	D0878241	13/08/2017	Grande-Bretagne	FRP
Phragmite des joncs	Acrocephalus schoenobaenus	14942269	05/08/2017	Belgique	FRP
Phragmite des joncs	Acrocephalus schoenobaenus	15143040	13/08/2017	Belgique	BLB
Rouge-gorge	Erithacus rubecula	CZ088538	16/10/2017	Suède	FRP
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	ZG069930	16/08/2017	Allemagne	FRP
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	CY053590	28/07/2017	Suède	FRP
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	14551065	25/08/2017	Belgique	NLA
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	14238101	05/06/2017	Belgique	FRP
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	ZG039606	08/08/2017	Allemagne	BLB
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	ZG039606	10/08/2017	Allemagne	DDH
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	14730733	15/08/2017	Belgique	BLB
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	7320405	03/08/2017	France	DFR
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	ZG027156	05/08/2017	Allemagne	SVS
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	HE007965	06/08/2017	Norvège	BLB
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	7783942	14/08/2017	France	GBT
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	14711335	25/08/2017	Belgique	SUK
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	BE057838	29/07/2017	Pays-bas	SUR
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	V0677803	12/05/2017	Allemagne	DFR
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	14467856	16/06/2017	Belgique	SVS
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	14620752	04/08/2017	Belgique	BLB
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	02Y78676	05/09/2017	Espagne	NLA
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	14371686	24/05/2017	Belgique	BLB
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	13285651	11/05/2017	Belgique	BLB
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	14377797	08/07/2017	Belgique	BLB

Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	14640613	05/08/2017	Belgique	CSP
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	14377690	28/05/2017	Belgique	BLB
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	ZG069930	17/08/2017	Allemagne	CSP
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	13561566	28/08/2017	Belgique	BLB
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	ZE022814	16/08/2017	Lituanie	BLB
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	J0190194	07/09/2017	Lettonie	DFR
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	DB011496	23/09/2017	Suède	BLB
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	BG099071	27/08/2017	Pays-bas	NLA
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	15275054	02/09/2017	Belgique	BLB
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	14467874	29/07/2017	Belgique	BLB
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	TT073694	04/08/2017	Rép tchèque	BLB
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	14974370	20/08/2017	Belgique	BLB
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	S0901044	22/08/2017	Rép tchèque	SVS
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus	15012264	07/09/2017	Belgique	BLB
Rousserolle verderolle	Acrocephalus palustris	13612424	27/07/2017	Belgique	DFR
Rousserolle verderolle	Acrocephalus palustris	7641673	04/06/2017	France	DFH
Rousserolle verderolle	Acrocephalus palustris	6628693	28/07/2017	France	NLA
Rousserolle verderolle	Acrocephalus palustris	14756489	20/07/2017	Belgique	BLB
Rousserolle verderolle	Acrocephalus palustris	14930637	06/08/2017	Belgique	BLB
Rousserolle verderolle	Acrocephalus palustris	B04V2766	05/09/2017	Allemagne	NLA
Rousserolle verderolle	Acrocephalus palustris	14930834	24/08/2017	Belgique	BLB

Captures ou observations « particulières » en 2017 dans la réserve naturelle Schlammmwiss – Uebersyren



Rémiz penduline 29.09, Bruant nain 09.04, Phragmite aquatique 30.07, Pie-grièche grise et Bergeronnettes printanières



Panures à moustaches 15.10, Pouillot à grands sourcils 01.10, Marouette ponctuée, Traquet motteux, Pluvier petit-gravelot 17.06 et Blongios nain 07.08

Visites, activités et autres








Nos bagueurs à l'étranger

Comme chaque année nos bagueurs sont allés baguer à d'autres stations de baguage:

Eric Kraus sur la station de baguage au Lac Baïkal, Russie

Au mois de juillet, j'ai passé 27 jours à la „Baikal Ringing Station“, comme bénévole. La station est active du début avril jusqu'au 15 octobre. D'une part les oiseaux sont capturés avec des filets, d'autre part avec une très grande nasse. Pendant les 25 jours, nous avons bagué 420 oiseaux.



Grive dorée, nasse utilisée pour capturer les oiseaux, rossignol calliope et pouillot de pallas

Max Steinmetz sur la station de baguage à Umea et Stora Fjärderägg, Suède

En cours d'automne 2017, j'ai participé à plusieurs activités de baguage dans les champs sud-ouest d'Umeå, site nommé T-Vägen. Ceci est un des seuls sites au Nord de la Suède où on capture non seulement les migrateurs sud-européens et africains, mais aussi des oiseaux qui migrent vers l'est jusqu'en Asie sud-est. Comme par exemple le bruant nain, bruant rustique et gorgebleue. Le delta du fleuve Umeälven, qui se jette dans la Mer Baltique, est une station importante de repos pour une multitude d'espèces de limicoles et d'oiseaux aquatiques arctiques en voie de migration. En approchant l'hiver, les espèces 'robustes' à la neige, surtout les oiseaux se nourrissant de graines et des baies comme sizerins, mésanges, jaseurs boréals et becs croisés des pins représentent la majorité des captures. Merci à l'équipe de la station pour l'expérience formidable - Darius, Thomas et Erik.



Bruant rustique, Pic tridactyle et Faucon émerillon

Calendrier 2018

A) Volet sensibilisation

1. Visites guidées officielles et journées Fit by Nature, organisées dans le cadre de manifestations et campagnes de N&E asbl et de la Fondation Hëllef fir d'Natur :

- 13.01.2018 : Fit by Nature
- 04.02.2018 : Visite guidée "Journée mondiale des zones humides"
- 10.02.2018 : Fit by Nature
- 24.02.2018 : Fit by Nature
- 25.03.2018 : Guided tour "Journée mondiale de l'eau"
- 13.05.2018 : En Dag an der Natur - Visite guidée "Vogelstimmen - Was singt denn da?"
- 24.06.2018 : Visite guidée "Mam Zuch an Natur" en coopération avec la CFL
- 10.06.2018 : En Dag an der Natur: Guided tour "Brutvögel - Was brütet denn da?"
- 04.07.2018 : Visite de classes scolaires en coopération avec la CFL
- 07.07.2018 : Visite des Arbitres de la FLBB - suite à leur AG

- 08.07.2018 : En Dag an der Natur: Vogelberingung für Jugendliche und Eltern
- 18.08.2018 : En Dag an der Natur: Guided tour " Schlammwiss by Night "
- 26.08.2018 : En Dag an der Natur: Porte ouverte "Schlammwiss - Birdringingstation"
- 30.09.2018 : World Birdwatchday

2. Visites guidées organisées sur demande

B) Volet pédagogique

- accueil de classes scolaires de l'enseignement primaire
- accueil de classes de l'enseignement secondaire
- accueil d'étudiants-notamment de l'université de Trèves et autres
- coopération avec la station d'épuration d'Uebersyren

C) Volet recherche scientifique et collecte de données

- exécution du mémorandum d'entente relatif aux mesures de conservation du phragmite aquatique (voir sur notre site fb. max mettre référence) ;
- inventaire S.T.O.C. ;
- inventaire et monitoring par baguage & observation de la population nicheuse de la rousserolle effarvate et de toutes les autres espèces nicheuses ;
- suivi de l'hibernation d'une population de pipits spioncelles et réalisation d'un atlas d'hiver de l'avifaune (zone natura 2000) ;
- participation au programme de baguage d'alouettes des champs de l'institut royal des sciences naturelles de Belgique ;
- participation au programme de baguage de cailles de l'institut royal des sciences naturelles de Belgique ;
- collecte de données pour la centrale ornithologique Luxembourg et l'institut Royal des sciences naturelles de Belgique ;
- collecte de données en vue d'un projet life pour la sauvegarde des roselières au Grand-Duché de Luxembourg et poursuite du projet pilote ;
- localisation des nicheurs de schlammwiss par position GPS sur tablette, en vue de la surveillance des effectifs et prise de décisions dans le plan de gestion de la réserve naturelle
- (projet subventionné par l'état afin de couvrir les dépenses relatives à un permanent pendant les mois de mai à septembre)
- instruction et initiation de 12 stagiaires bagueurs ;
- collecte de données pour le reporting du ministère de l'environnement ;
- prises d'échantillons relatives à la borréiose, de la grippe aviaire et de mouches plates ;

D) Volet gestion de la réserve naturelle

- gestion en fonction des besoins des espèces représentatives de la réserve naturelle en coopération avec les exploitants agricoles ;
- acquisitions d'espaces complémentaires ;

Merci au service technique

Au service technique composé de Hary Fischer, Claude Thiry, Sasha Adam et l'aide occasionnelle de la part du personnel de SIDEEST (station de purification) et le CNDS de Marc Jans - merci beaucoup à vous tous!



Sponsoring



Nous tenons à remercier cordialement tous nos sponsors et donateurs pour le soutien et leur fidélité!

Pour plus d'informations et pour rester à jour avec nos activités:

Vous pouvez nous trouver sur facebook sous "Birdringingstation 'Schlammwiss' ", souscrire notre newsletter et consulter notre site:

<http://www.naturschutz-ieweschtesyrdall-schlammwiss-birdringingstation.lu/>